

Může být porod ženy veden porodní asistentkou?

Jméno těhotné:

Datum:

Při příjmu těhotné ženy zkontrolujte a zaškrtněte:

- těhotenství $\geq 37+0-42+0$
- nejedná se o farmakologicky indukovaný porod (v případě indukce foley katetrem a dirupcí vaku blan, jedná se o nízké riziko a po dirupci vaku blan může být porod vedený porodní asistentkou)
- normální porodnická (bez porodu císařským řezem nebo kleštěmi v anamnéze, poloha podélná hlavičkou, jednočetné těhotenství
- normální vstupní vyšetření (moč, TK, UZ, pulz, OP, fyziologický stav – bez generalizovaných otoků, žloutenky, pruritu apod.)
- poloha podélná hlavičkou, jednočetné těhotenství
- absence chorob s vlivem na graviditu (**výjimky:** např. správně kompenzovaná hypofunkce štítné žlázy, alergie – s medikací dle potřeby – chronické záněty dutin, alergická rýma; nekomplikované varixy, stav po APPE, CHCE, nezávažných úrazech apod)
- fyziologický průběh dosavadního těhotenství (nevadí např. krvácení v prvním trimestru, dráždivá děloha, prodělaná IMC, zaléčený hrozící předčasný porod v anamnéze, hospitalizace pro příčinu, která pominula, např. gastroenteritis apod.) Gestační diabetes mellitus kompenzovaný pouze dietou není kontraindikací k vedení porodu porodní asistentkou.
- věk $\geq 18 -42$ let
- absence aktuálního zánětu (IMC, dýchacích cest, GIT potíže apod.)
- VP je čirá nebo dosud neodtekla
- normální CTG záznam - odmítá-li, pak normální auskultační příjmový nález
- eutrofický plod (dle ultrazvuku ne staršího než 4 týdny), bez známek závažných vrozených vývojových vad

Pokud jsou zaškrtnuta **VŠECHNA** políčka, může být rodící žena v péči porodní asistentky – požádejte lékaře o zápis do dokumentace.